

Premières observations de l'Aigrette ardoisée *Egretta ardesiaca* au Congo-Brazzaville

Jérôme Mokoko Ikonga^a et Hugo J. Rainey^b

First records of Black Heron *Egretta ardesiaca* for Congo-Brazzaville. We report four definite sightings of Black Heron *Egretta ardesiaca* on the Likouala aux Herbes River, on 12 February 2002 (at 01°15'N 17°25'E), 16 December 2004 (7.5 km east of Edzama village), 24 February 2005 (7 km east of Edzama) and 25 February 2005 (at 01°02'N 17°12'E), following a probable sighting of three individuals in February 2001 on the same river, c.100 km south of the 2002 record.

En février 2001, lors des comptages effectués dans le cadre du Programme de Dénombrements des Oiseaux d'Eau en Afrique (DOEA) le long de la rivière Likouala aux Herbes, au nord-est du Congo-Brazzaville, JMI observe en vol trois hérons entièrement noirs avec des orteils orangés. Ces caractéristiques correspondent à l'Aigrette ardoisée *Egretta ardesiaca* (Borrow & Demey 2001). Les populations riveraines, interrogées par la suite, confirment qu'elles avaient vu, bien que très rarement, une espèce de héron de coloration noire. Comme l'Aigrette ardoisée constitue une espèce jusqu'alors inconnue du pays, des observations complémentaires sont toutefois jugées nécessaires afin de confirmer sa présence.

Le 12 février 2002, JMI observe à nouveau un héron tout noir, sur un banc de sable de la Likouala aux Herbes, environ 100 km plus au nord de l'observation de 2001, à 01°15'N 17°25'E, entre la ville d'Epéna et le village d'Edzama. L'oiseau, qui se trouve à une distance d'environ 20 m, est identifié comme une Aigrette ardoisée, à cause de son plumage entièrement noir, sans aucune trace de blanc (ce qui élimine l'Aigrette à gorge blanche *E. gularis*, espèce inconnue du Congo), ses plumes de la tête hérissées et ses orteils jaune-orange, bien visibles en vol. Après s'être bien fait observer, l'aigrette s'envole pour rejoindre 100 m plus loin, sur un arbre, un groupe d'Aigrettes intermédiaires *E. intermedia*, de taille nettement plus grande.

Le 16 décembre 2004, deux Aigrettes ardoisées étaient observées par Madzoke-Bola le long de la Likouala aux Herbes, à 7,5 km à l'est du village d'Edzama. Quand l'observateur s'est approché jusqu'à 20 m, elles se sont envolées vers la rive opposée. L'observateur ne disposait pas d'ouvrage permettant d'identifier les oiseaux, mais quand il a

revu l'aigrette en février 2005, il a remarqué qu'il s'agissait de la même espèce.

Le 24 février 2005, HR et Madzoke-Bola observent une Aigrette ardoisée le long de la Likouala aux Herbes, à 7 km à l'est du village d'Edzama, proche de l'observation de décembre 2004. Elle était avec 30 Hérons garde-bœufs *Bubulcus ibis* et s'est envolée vers la rive opposée avec ceux-ci lors de l'approche des observateurs. Elle était entièrement noire, y compris les yeux et la gorge, sauf les orteils qui étaient jaune-orange. La nuque avait une petite huppe. Elle semblait un peu plus grande que les Hérons garde-bœufs.

Le 25 février 2005, lors du dénombrement annuel des oiseaux d'eau, JMI note une Aigrette ardoisée au bord de la Likouala aux Herbes, entre les villages d'Edzama et de Dzéké (01°15'N 17°25'E). L'aigrette se trouve à une distance d'environ 10 m en compagnie d'une dizaine de Hérons garde-bœufs. Elle est entièrement noire, sans tache blanche à la gorge, avec de longues plumes lancéolées sur la tête et la nuque formant une huppe; le bec, les yeux et les pattes sont noirs; les orteils orangés.

Ces données constituent les premières de l'Aigrette ardoisée pour le Congo: l'espèce ne figure en effet pas sur la liste du pays de Dowsett (1993), ni sur la carte de distribution dans Borrow & Demey (2001, 2004). L'Aigrette ardoisée est très rare en Afrique centrale forestière, avec quelques mentions seulement du Gabon et du sud du Cameroun et aucune de la République Centrafricaine ni de l'ouest et du centre du Congo-Kinshasa (Brown *et al.* 1982, Dowsett 1993, Borrow & Demey 2001, 2004).